

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION " LANGUEDOC-ROUSSILLON "

(AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41 42

ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de recettes de la D.D.A

C.C.P. Montpellier 5238-67

N°11 - 1er SEPTEMBRE 1983 -

RESEAU LEUCATE-FITOU

SPECIAL POURRITURE GRISE

Les conditions climatiques et de nombreux facteurs favorisant (vers de la grappe, oïdium ...) entraînent une brusque aggravation du risque Pourriture grise.

Cependant une observation minutieuse de vos parcelles s'impose avant de décider d'une intervention.

Nous vous rappelons que l'utilisation des fongicides anti-botrytis est réglementée et que l'observation du délai d'emploi avant récolte est impérative.

Produits conseillés :

Sumisclex (procymidone)	: 21 jours avant récolte
Ronilan (vinchlozoline)	: 15 " " "
Ronilan SP (vinchlozoline + soufre)	: 15 " " "
Rovral ou Kidan (iprodione)	: 15 " " "

L'utilisation de fongicides contenant du folpel doit être évitée à l'approche de la récolte.

VOUS NE DEVEZ ABSOLUMENT PAS TRAITER LES MUSCATS A PETITS GRAINS,
DONT LA RECOLTE EST TRES PROCHE

La réussite d'un traitement anti-botrytis dépend de la qualité de l'application, localisation au niveau des grappes et face par face.

Tirage du 1er septembre 1983 - 300 exemplaires

(c) Bulletin Technique des Avertissements Agricoles - MONTPELLIER 1983